

Exemple de gestion de cas COVID

Si besoin, proposition de mesure conjointe entre la Direction académique et la Direction de l'éducation (fermeture classe, école, etc.). Décision Maire et Dasen.

<div>Si symptômes COVID-19 chez l'enfant</div> <div><div>→ fièvre +38°</div><div>→ toux fébrile, respiration rapide, gêne respiratoire</div><div>→ tachycardie, marbrures</div><div>→ selles liquides, vomissements, douleurs abdominales</div></div>	<div>Si symptômes COVID-19 chez l'adulte</div>	
↓↓↓↓	↓↓↓↓	
⇒ Isolement, masque pédiatrique et respect des gestes barrières	⇒ Isolement, respect des gestes barrières, retour à domicile pour prise de RDV avec le médecin traitant et test PCR	
↓↓↓↓	↓↓↓↓	
	Enseignants et personnel périscolaire (si asso)	Pour le personnel Ville
⇒ Appel des parents / tuteurs légaux pour prise de RDV chez le médecin traitant afin de réaliser un test PCR	↓↓↓↓	
<div>Entre l'évocation des symptômes et la réalisation du test PCR</div> <div>Prise de contact du médecin scolaire avec la famille ou la personne, pour avoir des informations suite à la réalisation du test PCR afin d'informer le directeur d'école, le DAPS, le responsable de territoire éducatif que la procédure est en cours</div>		
↓↓↓↓	Si test PCR positif : médecin scolaire	Si test PCR positif : Médecine Préventive Professionnelle
⇒ Si test PCR positif : médecin scolaire contacte la cellule de veille et d'alerte de l'ARS	contacte la cellule de veille et d'alerte de l'ARS	contacte la cellule de veille et d'alerte de l'ARS
- Réalise l'enquête cas contacts via questionnaire	- Réalise l'enquête cas contacts via questionnaire	- Réalise l'enquête cas contacts via questionnaire
- Retourne les résultats de l'enquête cas contact à l'ARS qui	- Retourne les résultats de l'enquête	- Retourne les résultats de

décidera des personnes à tester	cas contacts à l'ARS qui décidera des personnes à tester	l'enquête cas contacts à l'ARS qui décidera des personnes à tester
	<p>Information des personnels et des parents des enfants ayant pu rentrer en contact avec l'adulte malade selon le plan de communication défini par l'établissement.</p> <p>Nettoyage minutieux et désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l'adulte dans les 48h qui précèdent son isolement.</p> <p>Les personnels psychologues de l'éducation nationale et de santé scolaire apportent leur appui.</p>	